ABORDAJE FARMACOTERAPÉUTICO DE LA TUBERCULOSIS EN EMBARAZADA Y RECIÉN NACIDO

ANA LAORDEN CARRASCO. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA

TBC

- Enfermedad infecciosa de declaración obligatoria de evolución crónica caracterizada por la formación de granulomas.
- Se dispone de tratamiento efectivo y económico pero es la 2ª causa mundial de mortalidad por un agente infeccioso (tras el VIH).
- Se estima que 1/3 de la población mundial está infectada por M. Tuberculosis

ETIOLOGÍA

- M. tuberculosis: bacilo alargado con cubierta externa. Longitud: 1-4 μ m → alcanza superficie alveolar
- Transmisión: Vía aérea mediante gotas (1-3 organismos/gota). Otras: ingestión e inoculación.
- Enfermedad Tuberculosa: Riesgo 10%. 50% en 2 primeros años tras exposición.

TBC pulmonar: 85% área apical de los pulmones.

TBC extrapulmonar :
linfático, pleural, ósea,
articulación y meníngea.
La mortalidad es muy alta si
no se trata.

TBC miliar: diseminada por el
inóculo masivo de organismos
en el torrente sanguíneo. Es
una emergencia médica

Tuberculosis en gestante

- Cambios inmunológicos embarazo → reactivación de la enfermedad.
- Posibilidad tuberculosis gestacional (VIH, inmunodeprimidas, inmigrantes de países endémicos).
- Cribado: cuadro clínico compatible o expuestas a un caso de TBC bacilífera.

TUBERCULOSIS NEONATAL

- Infección intrauterina o en el canal del parto (TB CONGÉNITA)
- Transmisión por vía respiratoria tras el parto (posnatal)

Tratamiento en gestante

GESTANTE EXPUESTA

NO ADMINISTRAR PROFILAXIS

Valorar si inmunosupresión, enf.
Crónicas o riesgo obstétrico
→ 6 meses

GESTANTE CON INFECCIÓN LATENTE

- ❖ Si inicio de tto pregestacional → continuar mismo tto.
- ❖ Si contacto no reciente ni factores de riesgo de progresión → Retrasar profilaxis hasta 3 semanas posparto
- ❖ Si contacto reciente o factores de riesgo de progresión → isoniazida 6 meses → resistencia: rifampicina 4 meses

HEPATOTOXICIDAD POR ISONIAZIDA:

Isoniazida → transaminasas antes de tto y a 1, 2, 4 y 6 meses
Ojo en consumo de alcohol/F. hepatotóxicos y antecedentes de enf. Hepática.

TRATAMIENTO EN GESTANTE CON ENFERMEDAD

PRIMERA LÍNEA:

Isoniazida (5-10 mg/kg/día máx. 300 mg)

Rifampicina (10 mg/kg/día máx. 600 mg)

Pirazinamida (25-30 mg/kg/día máx. 2000 mg)

Etambutol (15-20 mg/kg/día máx. 1600 mg)

2 meses
+ isoniazida + rifampicina 4 meses

Suspender etambutol cuando se constate sensibilidad a los 3 F.

En meningitis o pericarditis asociar corticoides

SEGUNDA LÍNEA: Contraindicados (D) estreptomina y amikacina por sordera congénita y quinolonas por afectación ósea fetal

TRATAMIENTO NEONATO

MANTOUX 0
MM/ IGRA -

EXPLORACIÓN
NORMAL

RX. TÓRAX
NORMAL

Profilaxis primaria con ISONIAZIDA 12 semanas → si
Mantoux/IGRA - →suspender

Si prematuro, desnutrido o inmunodeprimido → 9 meses

Si cepa caso índice resistencia a isoniazida →rifampicina 12 sem

Si resistencia a rifampicina → quinolona

EXPOSICIÓN

TBC LATENTE

ENFERMEDAD

TRATAMIENTO NEONATO

Pofilaxis secundaria ISONIAZIDA 9 meses

Si resistencias → rifampicina 6 meses

MANTOUX >5
mm/ IGRA +

EXPLORACIÓN
NORMAL

RX. TÓRAX
NORMAL

TRATAMIENTO NEONATO

MANTOUX >5 mm/ IGRA +

NEONATO SINTOMÁTICO

RX. TÓRAX PATOLÓGICA

2 MESES

Isoniazida
Rifampicina
Pirazinamida
Etambutol / Amikacina

9-12 MESES

Isoniazida +
Rifampicina

En TBC miliar o SNC → PREDNISONA (1-2 mg/kg/día)

Pauta tratamiento

	Dosis en pautas diarias, mg/kg/d (rango de dosis)	Dosis máxima diaria (mg)
Isoniacida	10 (7-15) ^{a,b}	300
Rifampicina	15 (10-20) ^a	600
Pirazinamida	35 (30-40)	2.000
Etambutol	20 (15-25) ^c	2.500
Estreptomina	15-20	1.000

LIMITACIONES

- Difícil cumplimiento: terapia combinada y tiempo prolongado
- En ayunas, media hora antes de la toma.
- Dosis para lactante > 3 meses
- Ausencia de presentaciones comerciales adecuadas para el lactante: FM vs Triturar comprimidos

Caso clínico

Gestante

- 20 años, origen boliviano
- Anorexia nerviosa. Pérdida de 20 kg. Pide laxantes, enemas y agua.
- Embarazo de captación tardía (23 SG)
- Ingres a 27+6 SG por NEUMONÍA BILATERAL CAVITADA Y TOS DE UN MES → M. TBC sensible a HRZE

- 12 días más tarde: ingresa obstetricia/neumo
- Inducción parto 35 SG
- Se desconoce si es bacilífera en el momento del parto

NEONATO

- Cesárea por NPP 35+1 SG
- RNPR. 2500 g.
- Bajo riesgo infeccioso. Exploración neurológica normal.
- Ingresa en neonatología para despistaje de TBC congénita
- ¿tratamiento o profilaxis?
- Aislamiento de contacto
- Lactancia materna en biberón

PRUEBA	RESULTADO
Laboratorio	
Bioquímica con transaminasas	GOT 34 (5-40) U/L
	ALT 5 (5-41) U/L
	GGT 287 (10-71) U/L
	FA 149 (35-231) UI/L
Quantiferón	Negativo
Microbiología	
Mantoux	Negativo
Tinción ZN, PCR, cultivo placenta y líquido amniótico	Negativo
Tinción ZN, PCR, cultivo aspirado gástrico (x3)	Negativo
Anatomía Patológica	
Estudio de placenta	Sin granulomas
Imagen	
Rx. Tórax	Sin infiltrados
Ecografía transfontanelar y abdominal	Normal
Fondo de ojo	Normal

Pruebas complementarias

Se descarta enfermedad activa → profilaxis Isoniazida/piridoxina 10 mg/Kg/día (7 ddv EC 35+2)

Instrucción padre

ALTA SIN COMPLICACIONES

MADRE

Rifampicina 300 (600 mg)
 + etambutol 1200 mg
 + amikacina ajustada a peso ideal
 + linezolid 600 mg/12h

+ isoniazida 300 mg

Rx tórax → mejoría de infiltrados y desaparición caverna LSI

Int. Nutrición → seguimiento, dieta bajo vigilancia y batidos hiperproteicos (+8 kg)
 Int. Psiquiatría → no precisa tto.

15 días tto → traslado a hospital de referencia y valorar suspender amikacina o linezolid

MICOBACTERIAS																																	
TINCION DE ZIEHL-NEELSEN / AURAMINA	POSITIVO Se han observado 1-10 bacilos ácido-alcohol resistentes por cada 10 campos microscópicos.		PPR	13087848	ASPIRADO BRONQUIAL																												
PCR COMPLEJO M. TUBERCULOSIS	POSITIVO Se ha detectado la presencia de una especie del complejo M. tuberculosis mediante la técnica de PCR. No se han detectado mutaciones génicas asociadas con resistencia a isoniazida ni a rifampicina. Por consiguiente, cabe esperar una buena respuesta clínica a la asociación de estos dos fármacos y pirazinamida. Este informe de sensibilidad tiene carácter preliminar. Se informará oportunamente del resultado del cultivo de micobacterias y del antibiograma convencional.		PPR	13087848	ASPIRADO BRONQUIAL																												
CULTIVO DE MICOBACTERIAS	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Mycobacterium tuberculosis</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Estado</th> <th>CMI</th> <th>Comentario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estreptomina</td> <td>Sensible</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rifampicina</td> <td>Sensible</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Isoniacida</td> <td>Sensible</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pirazinamida</td> <td>Sensible</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Etambutol</td> <td>Sensible</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Mycobacterium tuberculosis					Estado	CMI	Comentario	Estreptomina	Sensible			Rifampicina	Sensible			Isoniacida	Sensible			Pirazinamida	Sensible			Etambutol	Sensible				PPR	13087848	ASPIRADO BRONQUIAL
Mycobacterium tuberculosis																																	
	Estado	CMI	Comentario																														
Estreptomina	Sensible																																
Rifampicina	Sensible																																
Isoniacida	Sensible																																
Pirazinamida	Sensible																																
Etambutol	Sensible																																

Rifampicina

Riesgo muy bajo para la lactancia
 Seguro. Compatible. Mínimo riesgo para la lactancia y el lactante.

Amikacina

Riesgo muy bajo para la lactancia
 Seguro. Compatible. Mínimo riesgo para la lactancia y el lactante.

Isoniazida

Riesgo muy bajo para la lactancia
 Seguro. Compatible. Mínimo riesgo para la lactancia y el lactante.

Etambutol

Riesgo muy bajo para la lactancia
 Seguro. Compatible. Mínimo riesgo para la lactancia y el lactante.

Linezolid

Riesgo bajo para la lactancia
 Bastante seguro. Probablemente compatible. Riesgo leve o poco probable. Lea el Comentario.

CONTRIBUCIÓN DEL FARMACÉUTICO

- Validación de las prescripciones de madre e hijo.
- Gestión de documentación para isoniazida FFT en neonato.
- Elaboración de fórmula magistral de isoniazida-B6 para el neonato.
- Dispensación sucesiva de la FM en consultas de Pacientes Externos durante el tratamiento.
- Información sobre compatibilidad de fármacos y lactancia materna.
- Revisión de interacciones y monitorización de parámetros sugerentes de eventos adversos relacionados con el tratamiento.

GRACIAS