Manejo de toxoplasmosis cerebral en paciente VIH+

Cristina Portero Ponce
R1 Farmacia Hospitalaria
Hospital Morales Meseguer

ANTECEDENTES

EDAD: 40 años

SEXO: Hombre

ALERGIAS: No

PATOLOGÍAS: No antecedentes médicos de interés

Una semana antes del ingreso consulta en urgencias por malestar general, artromialgias, cefalea, astenia y fiebre de 39°C.

El 12/09 acude a urgencias por fiebre, heteroagresividad, movimientos espontáneos y deterioro del nivel de consciencia.

Ingresada en UCI con sospecha de meningococemia.

PRUEBAS DE VALORACIÓN

TAC Craneal

Lesiones hemorrágicas múltiples

Punción lumbar

Linfocitos polimorfonucleares
Glucosa reducida
Proteínas elevadas

Microbiología

VIH-1 (+)
Anticuerpos IgG anti-Toxoplasma gondii (+)

DIAGNÓSTICOS

Diagnóstico principal

Encefalitis por *Toxoplasma gondii*

VIH estadio C3

Diagnósticos secundarios

Traqueobronquitis asociada a ventilación mecánica por *Pseudomonas aeruginosa*

Neumonía asociada a ventilación mecánica por *Staphylococcus aureus*

Virus herpes simple 2

FARMACOTERAPIA

Día	Tratamiento	Indicación
Ingreso	Ceftriaxona VO 2g/12h Ampicilina VO 2g/4h Aciclovir VO 750 mg/8h	Sospecha de meningoencefalitis
+1	Pirimetamina VO 75 mg/24h Sulfadiazina VO 1500 mg/6h Ácido folínico por SNG 25 mg/24h	Determinación de anticuerpos IgG anti- <i>Toxoplasma gondii</i>
+12	Dolutegravir SNG 50 mg/24h Tenofovir/Emtricitabina SNG 25/200 mg/24h	VIH-1 (+)
(+19) - (+37)	Teicoplanina IV 400 mg/12h (3 días) Teicoplanina IV 200 mg/12h (15 días)	SARM

Día	Tratamiento	Indicación
(+19) - (+35)	Anidulafungina IV 200 mg (dosis de choque) Anidulafungina IV 100mg/24h	<i>Cándida albicans</i>
+30	Meropenem IV 2g/8h	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> sensible a Meropenem
+46	Aciclovir SNG 400 mg/8h	VHS-2 (+)

Medidas no farmacológicas

- Traqueotomía
- Ventilación mecánica
- Nutrición enteral por sonda nasogástrica

EVOLUCIÓN CLÍNICA

- ❖ Deterioro lento y progresivo del nivel de conciencia con tendencia a la somnolencia al ingreso.
- ❖ En las siguientes 24 horas, movimientos involuntarios e hipertonia generalizada.
- ❖ Rachas de taqui-bradicardia, hipo-hipertension e intensa diaforesis.
- ❖ Temblor generalizado en las primeras semanas controlado con levetiracetam, baclofeno y clonazepam.
- ❖ Durante todo el ingreso presenta febrícula de 38°C pero sin reactantes de infeccion muy elevados.
- ❖ Tras 7 semanas de tratamiento no hay una mejoría clara de las lesiones cerebrales.
- ❖ Actualmente sigue programa de rehabilitación a diario aunque no hay expectativas más allá de un buen posicionamiento en silla de ruedas y ligera capacidad de movilidad manual.

	Valor de referencia	Ingreso (12/09)	2-10	16-10	27-10
GPT (ALT)	[0-40 U/L]	224 U/L	63 U/L	181 U/L	179 U/L
GOT (AST)	[8-30 U/L]	65 U/L	46 U/L	128 U/L	94 U/L
Linfocitos T CD4	[500-1200 cel/ μ l]	10 cel/ μ l	-	13 cel/ μ l	18 cel/ μ l
Carga viral	-	406.000 copias/ml	-	89 copias/ml	-

TOXOPLASMOSIS

- ❖ Infección del SNC más común en pacientes VIH que no reciben profilaxis .
- ❖ Diagnóstico presuntivo:
 - Recuento de CD4 <100 células/ μ L.
 - Síntomas neurológicos como fiebre, cefalea
 - Anticuerpos IgG anti-*T. gondii*.
 - Imágenes cerebrales con lesiones.
 - LCR con predominio mononuclear, proteínas elevadas y glucosa reducida
- ❖ Tratamiento con pirimetamina y sulfadiazina junto con ácido folínico.
- ❖ Tiempo medio de respuesta de 5 días.

APORTACIÓN FARMACÉUTICA

- ❖ Validación del tratamiento prescrito al paciente durante su periodo de hospitalización.
- ❖ Atención farmacéutica durante el ingreso hospitalario.
- ❖ Comprobación de alergias medicamentosas.
- ❖ Validación del tratamiento antimicrobiano en función de los resultados del antibiograma.
- ❖ Ajuste de dosis del tratamiento según función renal y hepática.
- ❖ Validación de la administración por sonda nasogástrica de los antirretrovirales y compatibilidad con la nutrición enteral.
- ❖ Seguimiento farmacoterapéutico y farmacovigilancia en términos de seguridad y efectos secundarios.
- ❖ Comprobación de interacciones entre los fármacos del tratamiento.

The End